

2022 年山东省职业院校技能大赛中职组护理技能赛项

理论试卷（三）

本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。

试题均为单项选择题。以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。错选、多选或未选均无分。

1. 患者，男性，77 岁，因慢性阻塞性肺气肿入院。患者气短、喘憋、不能平卧，护士在患者哮喘时应给予的最佳体位是（ ）
A. 平卧位 B. 端坐位 C. 半卧位 D. 俯卧位 E. 头高足低位
2. 患者，男性，62 岁。因突发心前区疼痛，疼痛难忍，并伴有胸闷憋气，来院就诊，患者既往有糖尿病史 11 年、胃溃疡 18 年。经检查医生诊断为“急性前间壁心肌梗死”，特征性心电图变化出现在（ ）
A. V1~V5 导联 B. V1~V3 导联 C. V3~V5 导联
D. V6、I、aVL 导联 E. V1~V6 及 I、aVL 导联
3. 患者，男性，50 岁。因胸痛就诊，诊断为心绞痛。发生心绞痛的主要病因是（ ）
A. 主动脉瓣狭窄 B. 二尖瓣狭窄 C. 主动脉瓣关闭不全
D. 二尖瓣关闭不全 E. 冠脉管腔狭窄和痉挛
4. 患者，女性，32 岁，月经量多 2 年，近 4 个月来感乏力、头晕、心悸，查血红蛋白 65g/L，白细胞 $6.0 \times 10^9/L$ ，血小板 $140 \times 10^9/L$ ，骨髓象：红细胞增生活跃，中晚幼红细胞 45%，体积小，胞浆偏蓝，治疗首选（ ）
A. 肌注维生素 B12 B. 口服铁剂 C. 口服叶酸 D. 输血 E. 脾切除
5. 患者，女性，60 岁。有溃疡病史 10 余年。突然呕血约 500ml，伴有黑便，急诊入院。查体：神志清楚，血压 100/60mmHg，心率 110 次/分。以下护理措施中正确的是（ ）
A. 平卧位，头部略抬高 B. 三腔二囊管压迫止血 C. 呕吐时头偏向一侧，防止误吸和窒息
D. 快速滴入血管加压素 E. 暂时给予流质饮食
6. 患者男性，56 岁，有肝硬化病史 10 余年。近日食欲明显减退，黄疸加重。今晨因剧烈咳嗽突然呕咖啡色液体约 1200ml，黑便 2 次，伴头晕、眼花、心悸。患者上消化道出血最可能的原因是（ ）
A. 消化性溃疡出血 B. 食管胃底静脉曲张破裂出血 C. 急性糜烂性胃炎出血
D. 应激性溃疡 E. 胃癌出血
7. 患者，男性，50 岁。下班后与朋友聚餐，很晚回家休息。午夜突发左脚第 1 跖趾关节剧痛，约 3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难，遂来急诊就诊。检查血尿酸为 500mmol/L；X 线提示：可见非特征性软组织肿胀。患者可能诊断是（ ）
A. 痛风 B. 假性痛风 C. 风湿性关节炎 D. 类风湿性关节炎 E. 化脓性关节炎

8. 赵先生, 26 岁, 系统性红斑狼疮患者, 面部有较严重的蝶形红斑, 且有脱发及糖皮质激素治疗引起的容貌改变, 该患者最主要的护理诊断是 ()

- A. 疼痛 B. 活动无耐力 C. 自我形象紊乱 D. 知识缺乏 E. 焦虑

9. 急性呼吸窘迫综合征(ARDS)初期的临床特点是 ()

- A. 有严重低氧血症 B. 发绀 C. 有明显肺部体征 D. 呼吸困难 E. 深昏迷

10. 消化性溃疡特征性的临床表现是 ()

- A. 黄疸 B. 食欲下降 C. 恶心、呕吐 D. 反酸、嗝气 E. 节律性和周期性上腹痛

11. 患者, 男, 30 岁, 因车祸受伤入院。查体: 嗜睡, 刺痛能睁眼, 回答问题含糊不清, 对疼痛刺激能定位。其 Glasgow 昏迷分级计分应为 ()

- A. 5 分 B. 9 分 C. 10 分 D. 12 分 E. 15 分

12. 患者, 女, 58 岁, 有高血压病史, 最高血压 208/110mmHg, 因情绪激动后突然倒地不起, 陷入昏迷, 紧急入院抢救, 诊断为蛛网膜下腔出血, 造成蛛网膜下腔出血的原因是 ()

- A. 脑血栓 B. 脑栓塞 C. 脑出血 D. 颅内动脉破裂出血 E. 颅内恶性肿瘤破裂

13. 患者, 男性, 17 岁, 疑有肱骨嵌插骨折, 下列哪项是诊断骨折的最可靠的依据 ()

- A. 局部畸形 B. 局部剧烈疼痛 C. 骨擦感 D. X 线摄片 E. 功能障碍

14. 患者, 男性, 30 岁, 下腹部外伤 6 小时, 病人出现小腹隐痛伴排尿困难, 试插导尿管可以顺利进入膀胱, 注入 200ml 生理盐水后抽出不足 150ml。此种情况应首先考虑 ()

- A. 后尿道断裂 B. 前尿道断裂 C. 输尿管损伤 D. 膀胱损伤合并尿道损伤
E. 膀胱破裂

15. 患儿, 7 岁, 开水烫伤。双下肢有水疱, 剧痛, 胸腹部为红斑。估计该儿童 II° 烫伤面积是 ()

- A. 20% B. 41% C. 42% D. 46% E. 59%

16. 患者, 女性, 39 岁, 行下肢静脉曲张剥脱术后, 以下护理措施错误的是 ()

- A. 术后弹性绷带包扎 2 周 B. 绝对卧床休息 1 周 C. 睡觉时抬高下肢 30 度
D. 尽量穿宽松衣物 E. 适当体育锻炼

17. 患者, 女性, 39 岁, 因钝器敲击胸部后出现极度呼吸困难, 并在颈部和前胸部触及捻发感, 应采取的紧急处理措施是 ()

- A. 剖胸探查 B. 固定胸壁 C. 穿刺排气 D. 立即封闭胸壁伤口 E. 抗感染治疗

18. 患者, 女性, 48 岁。发现左乳房外上象限肿块, 直径为 4cm, 与皮肤轻度粘连, 并出现“酒窝征”, 左侧腋窝下扪及 3 个肿大淋巴结, 活动度尚可。皮肤出现酒窝征表示肿瘤已侵犯 ()

- A. 毛囊和汗腺 B. 皮下毛细淋巴管 C. 大的乳腺导管 D. Cooper 韧带 E. 胸大肌筋膜

19. 患者, 男性, 42 岁, 有 20 余年胃十二指肠溃疡病史。今日午餐进食较多, 并少量饮酒, 餐后突然上腹剧烈刀割样疼痛, 迅速全腹痛。查: 急性面容, 全腹压痛、反跳痛、肌紧张, 上腹板状。初步考虑是 ()

- A. 急性阑尾炎 B. 溃疡病急性穿孔 C. 急性胆囊炎 D. 急性胰腺炎 E. 溃疡病急性出血

20. 患者，女，57岁。胆总管结石。入院行胆总管切开探查，T型管引流术。术后针对T型管引流的护理措施，不妥的是（ ）

- A. 记录引流胆汁的量、色及性状 B. 每日用生理盐水冲洗T型管 C. 一般留置2周
D. 拔管前经T管胆道造影 E. 拔管前夹管观察1~2天

21. 某初产妇，23岁，妊娠38周，规律宫缩11小时。肛查：宫口开大8cm，诊断为（ ）

- A. 正常活跃期 B. 潜伏期延长 C. 活跃期延长 D. 正常第二产程 E. 第一产程延长

22. 27岁妇女，停经近3个月，阴道少量流血5日。查子宫如妊娠4个月大，软，双附件区各有5cm×5cm×3cm囊性肿物，本例应考虑是（ ）

- A. 先兆流产 B. 难免流产 C. 葡萄胎 D. 早孕合并卵巢囊肿 E. 先兆流产合并卵巢囊肿

23. 男童，7岁，因发热、寒战、头痛就诊，查体T40℃，咽部红肿，扁桃体红肿伴脓性分泌物，舌苔有一层白色苔，咽拭子培养为“A组乙型溶血性链球菌”，诊断为“猩红热”，皮疹最先出现部位是（ ）

- A. 耳后、颈部、上胸部 B. 发际、上胸部、背部 C. 颈部、胸部、背部
D. 胸部、背部、腹部 E. 躯干、四肢

24. 小儿发病率及死亡率最高的年龄期是（ ）

- A. 新生儿期 B. 婴儿期 C. 幼儿期 D. 学龄前期 E. 学龄期

25. 患者，女性，37岁，重度心力衰竭。患者表现乏力、呼吸困难，护士为其取端坐位，下列与不属于端坐卧位作用的一项是（ ）

- A. 使膈肌下降 B. 利于呼吸活动 C. 减少下肢血液回流
D. 减轻心脏负担 E. 增加心肌收缩力

26. 患者，男性，56岁，因摔伤后骨折入院，在急诊室给予输液、吸氧后，准备用平车送入病房，护送途中护士应注意（ ）

- A. 观察输液、吸氧情况，避免中断 B. 暂停输液、吸氧 C. 暂停吸氧，输液继续
D. 暂停输液，吸氧继续 E. 暂停护送，待病情好转后再送入病房

27. 患者，女性，53岁，因多发性子宫肌瘤住院，今上午拟在硬膜外麻醉下行全子宫切除术。术前准备做留置导尿时，护士应指导患者取（ ）

- A. 半坐卧位 B. 头低足高位 C. 去枕仰卧位 D. 膝胸位 E. 屈膝仰卧位

28. 患者，女性，42岁，因肺炎给予红霉素静脉滴注，用药2日后注射部位出现沿静脉走行方向条索状红线，伴红、肿、热、痛等症状。下述护理措施错误的一项是（ ）

- A. 患肢适当抬高 B. 患肢适当活动 C. 50%硫酸镁湿敷
D. 局部超短波理疗 E. 遵医嘱给抗生素治疗

29. 患者，女性，63岁，因外伤致昏迷，需要鼻饲维持营养。护士操作时应注意，每次经胃管灌入的流质量不应超过（ ）

- A. 200ml B. 250ml C. 300ml D. 350ml E. 400ml

30. 患者，男性，43岁，腹胀难忍，医嘱予肛管排气，护士进行肛管排气操作时，肛管插入肛门的长度为（ ）

A. 7~10cm B. 10~15cm C. 15~20cm D. 15~18cm E. 10~20cm

31. 患者，女性，28岁，近日晨起呕吐，月经停止，疑为早孕，为确诊需采集尿标本，留取标本时间宜为（ ）

A. 饭前 B. 饭后2h C. 即刻 D. 睡前 E. 晨起

32. 患者，女性，32岁，因糖尿病需皮下注射胰岛素4U，护士为此患者进行皮下注射时的进针角度为（ ）

A. $0^{\circ} \sim 5^{\circ}$ B. $30^{\circ} \sim 40^{\circ}$ C. 45° D. 60° E. 90°

33. 患者，男性，53岁，服用地高辛几天后，出现恶心、呕吐、视物模糊，护士应立即（ ）

A. 报告护士长 B. 给予止吐药甲氧氯普胺 C. 做心电图检查
D. 做好患者心理护理 E. 停止服药并报告医生

34. 患者，女性，42岁，乳癌切除术后，此次因化疗收入化疗病房。护士在准备化疗药物的操作过程中，做法正确的是（ ）

A. 在普通治疗室内配药 B. 用双手直接掰开安瓿时应小心刺伤
C. 抽取的药液以不超过注射器容量的3/4为宜 D. 静脉给药时无需戴手套
E. 静脉给药时中途如需加药须尽快加药

35. 用于心肺复苏的药物中，目前首选的是（ ）

A. 肾上腺素 B. 利多卡因 C. 阿托品 D. 碳酸氢钠 E. 苯妥因钠

36. 有机磷农药中毒时，代谢失常的神经递质是（ ）

A. 多巴胺 B. 乙酰胆碱 C. 5-羟色胺 D. 肾上腺素 E. 去甲肾上腺素

37. 护士在与一位病人交谈时，病人说：“我感觉今天天气很闷热，心脏不舒服”。护士问道：“您刚才说您心脏不舒服吗？”此时护士主要运用了交谈技巧中的（ ）

A. 倾听 B. 核实 C. 阐释 D. 鼓励 E. 提问

38. 孙先生，68岁。因“心绞痛”急诊入院。病人情绪紧张，主诉乏力，食欲不振。护士评估病人存在以下护理问题，需要首先解决的是（ ）

A. 活动无耐力 B. 有便秘的危险 C. 疲乏 D. 疼痛 E. 焦虑

39. 患者，男性，38岁，曾有吸毒史，患者要求护士保密。护士可以向谁提及此事（ ）

A. 护理部干事 B. 医务处处长 C. 患者的主治医师
D. 患者的上级领导 E. 患者的配偶和女儿

40. 患者，女性，33岁，子宫肌瘤择期手术。根据我国《献血法》规定，为保障临床急救用血需要，对择期手术患者，应提倡采用的用血方式是（ ）

A. 互助献血 B. 同型献血 C. 自身储血 D. 自愿献血 E. 输成分血